

蚊（ヤブカ）に御注意！

回覧

最近、ブラジルにおいて小頭症の新生児が増えており、ジカウイルスの感染が関連しているのではないかと考えられています。また、2014年夏、我が国で70年ぶりにデング熱が流行しました。

これらの感染症を予防するためには、ヤブカの発生を抑えるとともに、ヤブカに刺されないようにすることが大切です。

ジカウイルス感染症・デング熱の性状（2016年4月1日現在）

	ジカウイルス感染症	デング熱
症状	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 軽度の発熱、発疹、結膜炎、筋肉痛、関節痛、倦怠感など。 ✓ 潜伏期間は2～12日（多くは2～7日） ✓ 80%は感染しても症状が出ない。 ✓ 妊婦が感染すると胎児に感染することがあり、小頭症などの先天性障害を起こす可能性がある。 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 突然の発熱、頭痛、眼窩痛、筋肉痛、関節痛、発疹など。 ✓ 潜伏期間は2～15日（多くは3～7日） ✓ 感染しても発症しないことも多くみられる。 ✓ ごまれに重症化し、出血症状となり、適切な治療がなされないと、致死的な病態になる。
流行地	<ul style="list-style-type: none"> ✓ アフリカ、中南米、アジア太平洋地域 ✓ 特に、近年は中南米で流行が拡大 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 熱帯や亜熱帯の全域
媒介蚊	ネッタイシマカ・ヒトスジシマカ（国内ではヒトスジシマカ）	
国内発生	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 海外の流行地で感染し、国内で発症した患者は7名 ✓ 日本国内で感染した患者なし 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 海外の流行地で感染し、国内で発症した患者は毎年200名前後 ✓ 2014年、東京都立代々木公園に関連する患者160名の報告
治療薬	特有の治療薬はなく、対症療法（予後は比較的良好）	
ワクチン	開発されていない。	

どのようにして感染するのですか？

デング熱とジカウイルス感染症いずれも、ウイルスに感染した人の血を吸ったヤブカ（ヒトスジシマカやネッタイシマカ）が体内でウイルスを増やし、その蚊がまた他の人の血を吸うことで感染を広げていきます。



国内でジカウイルスに感染することはありますか？


ウイルスを媒介する蚊の一つヒトスジシマカは、日本のほとんどの地域に生息しており、岐阜県内においても、すべての地域で生息を確認しています。（ネッタイシマカは国内に生息していません。）

国内でジカウイルスに感染した報告はありませんが、流行地でウイルスに感染した人（日本人帰国者や外国人旅行者）が国内でヒトスジシマカに刺され、そのヒトスジシマカが他の人の血を吸えば、感染する可能性があります。

どのように予防すればよいですか？

ヤブカは日中活動し、ヤブや木陰などでよく刺されます。その時間帯に屋外で活動する場合には、できるだけ肌の露出を少なくし、虫よけ剤を使用します。

日中屋外で活動する時は・・・



流行地で蚊に刺されたらどうすればよいですか？

すべての蚊がウイルスを保有している訳ではないので、蚊に刺されたことだけで過分に心配する必要はありません。

心配な方や発熱等の症状のある方は、帰国された際に、検疫所でご相談ください。

帰国後に心配なことがある場合は、最寄りの保健所にご相談ください。

妊婦と妊娠の可能性がある女性へ

妊婦や妊娠の可能性がある方は、ジカウイルス感染症の流行地への渡航を控えたほうがよいとされています。

流行地から帰国された男性へ

性交渉による感染リスクが指摘されています。ジカウイルス感染症の流行地域から帰国した男性で、特にパートナーが妊娠中の場合、症状の有無にかかわらず、性行為の際にコンドームを使用してください。

